

DÉNOMINATION	HUANG QI <i>Radix astragali</i>
NATURE	<i>Légèrement tiède</i>
SAVEUR	<i>Doux</i>
TROPISME	<i>Rate - Poumon</i>
PARTIE UTILISÉE	<i>Rhizome</i>
POSOLOGIE	<i>9 à 30 grammes</i>
CONTRE-INDICATIONS	<i>Syndrome de Plénitude Chaleur - Stagnation du Qi</i>

ACTIONS	PRESCRIPTIONS
<p>Tonifie la Rate et favorise le Qi Fait remonter le Yang central de la Rate et de l'Estomac Consolide le Biao et arrête la transpiration Tonifie le Qi et le Sang Favorise la couche défensive (Wei Fen) Evacue le pus Favorise la cicatrisation Aide à la réduction des œdèmes</p>	<p>Ce produit rentre dans la composition d'un nombre important de formules parmi lesquelles :</p> <p>BU ZHONG YI QI TANG *</p> <p>BU YANG HUAN WU TANG *</p> <p>DANG GUI BU XUE TANG</p>

* prescription où le produit est empereur

INDICATIONS	ASSOCIATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Vide de Rate avec manque d'appétit, fatigue, diarrhées - Effondrement du Qi central avec prolapsus utérin, anal ou de l'Estomac - Perte de la fonction de contention de la Rate avec saignements utérins continus ou discontinus - Vide de Wei Qi avec transpiration spontanée, frilosité, rhumes - Vide de Rate avec œdème, œdème de surface dû à l'attaque du Biao par le vent - Vide des méridiens par attaque du vent avec hémiplégie - Abscesses, furoncles, retard de cicatrisation après suppurations - Vide de Qi et de Sang avec fièvre après hémorragie ou accouchement 	<ul style="list-style-type: none"> + FU ZI pour transpiration spontanée par vide de sang + REN SHEN (ou DAN SHEN) pour le vide de Qi avec inappétence, transpiration spontanée, affaiblissement général + GUI ZHI pour les syndromes Bi par vide de sang ou dysharmonie entre Ying et Wei + FANG JI pour l'œdème vent + SHENG MA, CHAI HU pour l'effondrement du Qi central + DANG GUI pour le vide de Qi et de sang avec fièvre vide (hémorragie) + BAI ZHU pour le vide de Rate + CHUAN SHAN JIA pour abscesses suppuratifs immatures + MU LI pour transpiration spontanée ou nocturne par vide de Qi, de Yang ou de Yin + SHAN YAO, MAI MEN DONG pour le syndrome Xiao Ke (Diabétiforme)